

Plan zum vorübergehenden Absetzen von Marcumar

Name:

Vorname:

Geb. Dat.:

Aus Gründen einer geplanten Operation oder aus anderen Gründen soll Marcumar vorübergehend abgesetzt werden.

Der geplante Eingriff ist am:

Bitte nehmen Sie die letzte Marcumar-Dosis am: 9 Tage vor dem Eingriff

Fangen Sie mit der ersten Spritze Heparin (Innohep 20 000) an: 2 Tage nach Einnahme der letzten Marcumardosis

Spritzen Sie täglich 1 Amp. subcutan (bis 60 kg: 0,5ml/ bis 80 kg: 0,7ml/ bis 100 kg: 0,9ml)

Laborkontrollen sind nötig für Bestimmung der Thrombozyten
am: 1 Tag vor der 1. Heparin-Spritze, 3. und 6. Tag nach der 1. Heparin-Spritze

Laborkontrollen sind nötig für die Bestimmung des Quick-Wertes (INR)
am: 1-2 Tage vor dem Eingriff

Am Op-Tag keine Heparin-Spritze!

Den Operateur bitte fragen, wann nach der Operation wieder mit der Heparin-Spritze angefangen werden soll.

Die Heparin-Spritze muß dann (tägl. 1x) fortgesetzt werden, bis der Quick-Wert wieder zwischen 17-33 % ist (in der Praxis nachfragen). Parallel zu den Spritzen, als anfänglich zusätzlich zu diesen, beginnen Sie wieder mit Marcumar am:
Operateur fragen !

Weiteres Vorgehen nach Absprache mit Praxis (bitte hier nachfragen).

Danach kommen Sie wieder zur nächsten Kontrolle des Quick-Wertes (INR) am:

Mit freundlichem Gruß

Ihre Praxis Drs. Tim & Ursula Orth-Tannenberg

(Therapeutische oder halbtherapeutische Dosis in Abhängigkeit vom Risiko; keine prophylaktische Dosis)